Svenska Barnläkarföreningen
The Swedish Paediatric Society

SPGHN

Barn eller ungdom med Disorder of Gut-Brain Interaction (DGBI)

Uppfyller inte kriterierna för IBS, dyspepsi, bukmigrän eller funktionellt illamående

Måste inkludera alla följande minst 4 gånger/månad:

- Episodisk eller kontinuerlig buksmärta utan tydligt samband med fysiologiska händelser (ex matintag eller menstruation)
- Uppfyller ej samtidigt kriterierna för någon annan DGBI-diagnos såsom funktionell dyspepsi, IBS eller bukmigrän

Funktionell buksmärta UNS
K59.8

Återkommande illamående

Måste inkludera alla följande minst 2 gånger/vecka:

- Besvärande illamående som huvudsakligt symptom. Generellt inte relaterat till måltid.
- Inte regelmässigt associerat med kräkningar.

Funktionellt illamående
R11.0

Buksmärta i kombination med förändrade/avvikande avföringsvanor

Förstoppning

NEJ

IBS-D, -M eller –UNS
K58.1, K58.3, K58.9

Symtomfri med adekvat behandling mot förstoppning

Funktionell förstoppning
K59.0

NEJ

IBS-C
K58.2

- Postprandiell fyllnadskänsla
- Tidig mättnadskänsla
- Epigastriell smärta eller brännande känsla (utan relation till tarmtömning).

Symtom i kombination med förändrade/avvikande avföringsvanor

NEJ

- Besvärande fyllnads- eller mättnadskänsla som gör att en normal måltid inte kan fullföljas.
- Diagnosen stöds av uppblåsthet av övre delen av magen, illamående efter måltid eller uttalade rapningar.

Postprandiellt smärtsyndrom
K30.9

NEJ

- Besvärande smärta eller brännande känsla i epigastriet som påverkar normala aktiviteter.
- Smärtan är inte generell eller lokaliserad i andra delar av buken.
- Smärtan lättar inte efter tarmtömning eller gasavgång.
- Diagnosen stöds av att smärtan inte är retrosternal eller att den ofta ökar eller lindras av matintag (men kan förekomma även vid fasta).

Epigastriellt smärtsyndrom
K30.9

NEJ

Funktionell dyspepsi UNS
K30.9